DESKRIPSI MORFOLOGI JENIS ULAR DAN KATAK PADA KAWASAN HUTAN PULAU MANSINAM

(Morphological Description of Snake and Frog Species in the Forested Area of Mansinam Island)

Tirza Abaire¹ dan Meliza S. Worabai¹✉

Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Papua Manokwari, Papua Barat,
98314. Tlp/Fax: +62986211065.

✉Penulis Korespondensi: Email: meliza_wrb@yahoo.com

Diterima: 8 Feb 2018| Disetujui: 2 Mar 2018

Abstrak

Penelitian ini dilakukan pada kawasan hutan Pulau Mansinam selama satu minggu dengan tujuan untuk mengetahui morfologi ular dan katak yang ditemukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif dan teknik observasi lapang dan penemuan secara langsung dari jenis yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 3 jenis ular dan 3 jenis katak yang ditemukan pada kawasan hutan Pulau Mansinam. Jenis-jenis tersebut ialah 3 dari kelas reptil: *Laticauda colubrina*, dari famili hydrophiidae, *Stegonotus cuculatus* dari famili colubridae, *Candoia* sp. dari famili boidae dan 3 dari kelas amfibi; *Litoria infrafernata* dari famili hylidae, *Rana* sp. dan *platmantis papuaensis* dari famili ranidae.

Kata kunci: Deskripsi morfologi, amfibi, reptil, kawasan hutan, Pulau Mansinam.

Abstract

*This study has been carried out in forested area of Mansinam Island with duration of one week in order to determine morphological attributes of snake and frog species found. Method that applied in the study was descriptive through field observation technique by directly identifying objects during field walking across the island. The result pointed out that there were three species of snakes and another three species of frogs in the island. These species then elaborated into: three species came from reptile class: *Laticauda colubrina*, from hydrophiidae family, *Stegonotus cuculatus* from the family of colubridae, *Candoia* sp. from the family of boidae and three were from amphibian class; *Litoria infrafernata* from the family of hylidae, *Rana* sp. and *platmantis papuaensis* from the family of ranidae.*

Keywords: Morphological description, amphibian, reptile, forest area, Mansinam Island.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau dengan ukuran yang bervariasi serta dengan komposisi tumbuhan dan hewan yang kompleks. Berdasarkan

endemisitasnya, invertebrata merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati yang tersebar di dunia (Iskandar dan Erdelen 2006). BAPPENAS (1993) menyatakan bahwa 16% dari jumlah amfibi dan reptil di dunia terdapat di

Indonesia dengan jumlah lebih dari 1.100 jenis. Herpeofauna adalah kelompok fauna yang terdiri dari reptil dan amfibi yang berasal dari kata *herpeton* yang berarti binatang melata. Dengan adanya perkembangan ilmu taksonomi yang terus berkembang maju, reptil dan amfibi dimasukkan ke dalam satu kelompok hewan melata. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya ilmu tentang biologi akhirnya di pisahkan menjadi dua kelompok. Kedua kelompok ini di masukan ke dalam bidang ilmu herpetologi karena mempunyai cara hidup yang serupa, sama-sama satwa vertebrata eksotermal (membutuhkan suhu panas eksternal). Reptil maupun amfibi dapat ditemukan mulai dari dataran rendah sampai pada dataran tinggi. Amfibi tidak ditemukan dilaut sedangkan reptil dapat ditemukan pada lautan (Alonso et al. 2000).

Salah satu kelompok reptil yang sangat dikenal adalah ular yang di klasifikasikan ke dalam ordo *Squamata*, Sub-ordo invertebrata (*Ophidia*). Saat ini di seluruh dunia terdapat 2500-2700 spesies ular dengan 414 genus dan 13 famili. Ular terdistribusi di seluruh permukaan bumi kecuali daerah Artik, Islandia, Selandia Baru, dan beberapa Pulau kecil di lautan luas (Obst et al.1988). Keberadaan reptil pada suatu ekosistem memberikan peranan dalam suatu mata rantai untuk menjaga keseimbangan ekosistem, karena reptil merupakan karnifora pada rantai makanan. Saat ini reptil mengalami penurunan populasi dalam skala global dan terdapat lima ancaman yang signifikan dalam mempengaruhi kepunahan reptil yaitu kehilangan habitat, degradasi, introduksi, polusi lingkungan,

penyakit, dan perubahan iklim global (Gibbons et al. 2000).

Amfibi merupakan salah satu komponen penyusun ekosistem yang memiliki peranan sangat penting, baik secara ekologis maupun ekonomis. Secara ekologis, amfibi berperan sebagai pemangsa konsumen primer seperti serangga atau hewan invertebrata lainnya (Iskandar 1998). Serta dapat digunakan sebagai bio-indikator kondisi lingkungan (Stebbin & Cohen 1997). Indonesia memiliki dua dari tiga ordo amfibi yang ada di dunia yaitu *Gymnophiona* dan *Anura*. Ordo *Gymnophiona* dianggap langka dan sulit diketahui keberadaannya, sedangkan ordo *Anura* merupakan yang paling mudah ditemukan di Indonesia sekitar 450 jenis atau 11% dari seluruh jenis anura di dunia. ordo *Caudata* merupakan satu - satunya ordo yang tidak ditemukan di Indonesia (Iskandar 1998).

Papua merupakan provinsi terbesar di Indonesia seluas 416.000 km² yang menempati bagian Barat New Guinea adalah pulau tropis terbesar dan terkaya di Indonesia. New Guinea merupakan permata diantara pulau-pulau katulistiwa dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan unik, sebagian besar spesies yang ditemukan pada pulau ini bersifat endemik. Menurut lokakarya konservasi keanekaragaman hayati Irian Jaya (Sekarang Papua) di Jayapura, tahun 2000 menyebutkan bahwa Papua memiliki 20.000-25.000 spesies tumbuhan berkayu; 164 spesies mamalia; 329 spesies reptil dan amfibim 650 spesies burung; 250 spesies ikan air tawar; 150.000 spesies serangga; dan beratus ratus invertebrata air tawar. Sampai saat ini paling sedikit ada 231 spesies reptil yang telah diketahui dari Papua (Conservation

International 2000). Reptil yang terdapat di Papua terdiri dari tiga ordo yaitu: ordo *squamata* (kadal dan ular), *testudinata* (kura-kura dan penyu), dan *crocodilia* (buaya). Tercatat kadal di Papua berjumlah 141 jenis, ular 83 jenis, kura-kura dan penyu 15 jenis dan buaya 2 jenis (Dumutu 2010). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui morfologi ular dan katak yang ditemukan pada kawasan hutan Pulau Mansinam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada kawasan hutan Pulau Mansinam, Kabupaten Manokwari yang berlangsung selama 2 bulan yakni bulan Mei s/d Juni 2015 (1 minggu kegiatan pengamatan langsung di lapangan dan selanjutnya pengolahan data lapangan) dengan metode deskriptif yaitu melalui satu teknik pengambilan yakni teknik *Visual Encounter Survey* (VES) atau teknik survei perjumpaan visual (Conservation International 2000). Metode ini dilakukan secara diurnal dan nokturnal yaitu pengamatan pada siang serta malam melalui jalur transek pengamatan. Dalam penelitian ini variabel yang diamati meliputi deskripsi morfologi jenis ular dan katak. Morfologi ular dan katak yang diamati meliputi warna tubuh dan panjang tubuh dari masing-masing jenis.

Prosedur Penelitian

A. Persiapan

Persiapan awal yang dilakukan sebelum melakukan pengamatan, yaitu menentukan lokasi pengamatan dengan menggunakan GPS, kemudian pada lokasi yang telah ditetapkan, dilakukan pembuatan transek pengamatan sepanjang 1 km pada siang hari sebagai jalur pengumpulan data.

B. Proses Pengumpulan Data

Waktu pengamatan serta pengumpulan sampel reptil dilakukan dua kali dalam satu hari yaitu pada siang hari pukul 09.00 - 12.00 WIT dan pada malam hari pukul 17.00- 22.00 WIT. Pengamatan yang dilakukan yaitu sepanjang jalur transek dan jenis yang ditemukan selanjutnya langsung didata. Untuk jenis ular ditangkap dengan menggunakan kayu bercabang seperti huruf Y sedangkan katak ditangkap menggunakan sarung tangan. Jenis ular dan katak yang besar ditangkap dan dimasukkan ke dalam kantung spesimen yang telah diberi nomor/label spesimen. Setelah itu dilakukan pencatatan tipe dan kondisi habitat serta suhu dan keadaan cuaca.

C. Pembuatan Spesimen

Jenis reptil dan amfibi yang ditemukan, sebelum dilakukan pembuatan spesimen terlebih dahulu difoto. Setelah itu spesimen dibuat guna proses identifikasi lanjutan. Pembuatan spesimen dibuat dalam bentuk spesimen basah. Pembuatan spesimen basah dilakukan untuk jenis reptil yang berukuran kecil atau ular.

D. Preservasi

Preservasi (pembusuan) dengan cara memasukan jenis reptil dan amfibi kedalam wadah yang berisikan cairan chlorobutanol, khususnya untuk jenis reptil yang berukuran kecil sedangkan untuk jenis reptil dan amfibi yang berukuran besar di suntik dengan menggunakan alkohol 70%.

Analisis Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel dan gambar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis Yang Ditemukan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pulau Mansinam, selanjutnya didata enam jenis amfibi dan reptil. Keenam

Tabel 1. Jenis-jenis ular dan katak yang ditemukan di lokasi pengamatan Pulau Mansinam

Kelas	Ordo	Famili	Spesies	Jumlah
Amfibi	Anura	Hylidae	<i>L. infrafronata</i>	8
		Ranidae	<i>Rana</i> sp.	16
			<i>P. papuensis</i>	12
Reptil	Squamata	Hydrophiidae	<i>L. Colubrina</i>	2
		Colubridae	<i>S. Cuculatus</i>	2
		Boidae	<i>Candoia</i> sp.	1
Jumlah	2	5	6	41

Dapat dilihat bahwa dari tiga jenis amfibi yang ditemukan terdiri dari dua famili yaitu Hylidae dan Ranidae. Sementara reptil yang ditemukan terdiri dari tiga famili yaitu, Hydrophiidae, Colubridae dan Boidae. Dari keenam spesies yang ditemukan, individu yang paling banyak adalah berasal dari jenis *Rana* sp. yang merupakan kelas amfibi. Sedangkan jenis yang paling sedikit ditemukan adalah spesies *Candoia* sp. dari kelas reptil. Hal tersebut kemungkinan disebabkan kurangnya waktu pengamatan yang dilakukan dimana jika pengamatan dilakukan lebih lama, kemungkinan akan ditemukan hasil yang berbeda, karena habitat di Pulau Mansinam sangat mendukung keberadaan spesies reptil.

Deskripsi Karakteristik Morfologi Jenis Reptil dan Amfibi Yang Ditemukan

A. Reptil (Ular)

Reptil adalah hewan bertulang belakang yang bersisik dan bernapas

jenis tersebut masing-masing terdiri dari tiga spesies amfibi dan tiga jenis reptil. Data amfibi dan reptil di kawasan hutan Pulau Mansinam dapat dilihat pada tabel 1.

dengan paru-paru. Ciri utama reptil adalah tubuhnya yang ditutupi dengan sisik-sisik rata atau berduri yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi air melalui kulitnya (McLaren dan Rotundo 1985 dalam Yusuf 2008). Reptil yang ditemukan di Pulau Mansinam terdiri dari tiga spesies yaitu, *Stegonotus Cuculatus*, *Laticauda colubrina* dan *Candoia* sp.

1. Famili Hydrophiidae

Laticauda colubrina memiliki warna tubuh ventral belang-belang hitam dan putih, warna dorsal putih. Bentuk kepala segitiga agak tumpul sampai mulut yang sangat kecil. Tubuhnya bila dilihat dari atas air tampaknya memiliki warna kuning samar dan bentuk arah mata horizontal. Memiliki ekor melebar pada bagian ujung sebagai alat untuk berenang. Spesies ini diketahui sangat berbisa meskipun tidak agresif.

Gambar 1. Jenis-jenis amfibi dan reptil yang ditemukan pada kawasan hutan Pulau Mansinam: 1). jenis *Laticauda colubrine*; 2). jenis *Stegonotus cuculatus*; 3). jenis *Candoia* sp.; 4). jenis *Litoria infrafernata*; 5). jenis *Rana* sp.; 6). jenis *Platymantis papuensis*.

Jenis makanan yang dikonsumsi berasal dari laut yaitu ikan dan kerang. Panjang tubuh ular ini ± 58 cm dan umumnya ular ini memiliki bentuk tubuh yang pipih, dan segi. Lubang hidung berkatup pada ujung atas moncong, serta memiliki bentuk kepala seperti kerucut (O'Shea 1996).

2. Famili Colubridae

Stegonotus cuculatus memiliki warna pangkal sisik tubuh ventral putih sampai hitam mengkilap pada ujung sisik. Sementara pada bagian kepala sisik berwarna hitam mengkilap. Pada bagian dorsal sisik berwarna putih.

Stegonotus cuculatus ditemukan pada saat pengamatan malam, dimana pada saat ditemukan berada di pinggiran banir pohon, tepatnya di atas serasah di lantai hutan. Spesies ini merupakan kelompok ular yang berbisa, makanannya berupa katak dan kadal. Panjang tubuh jenis ini ular ini $\pm 70,9$ cm. O'Shea (1996) menyebutkan bahwa famili Colubridae memiliki sisik ventralnya yang berkembang dengan baik, melebar sesuai dengan lebar perutnya. Kepala biasanya berbentuk oval dengan sisik-sisik yang tersusun dengan sistematis, memiliki tiga sisik besar diantara mata. Ekor umumnya silindris dan meruncing. Kebanyakan anggota famili Colubridae tidak berbisa atau berbisa namun tidak terlalu mematikan bagi manusia.

3. Famili Boidae

Candoia sp., memiliki warna tubuh ventral dan dorsal abu

kecokelatan serta adanya variasi belang-belang putih pada bagian ventral kepala sampai ke bagian ekor. Kepala berbentuk segi tiga agak meruncing dan agak lonjong. Panjang tubuh dapat mencapai 1 meter.

Ciri khas ular *Candoia* sp. adalah hidung yang berbentuk kotak/balok, tidak berbisa dan tidak agresif. Biasanya hidup di dahan pepohonan, namun sering juga ditemukan di tanah. Aktif pada malam hari untuk mencari mangsa utamanya yaitu kadal kecil, cicak dan mamalia kecil. Posisi saat ditangkap melingkar di atas dahan pepohonan.

1. Famili Hylidae

Litoria infrafernata Guenther, 1867. *Litoria infrafernata* termasuk golongan katak pohon yang sangat umum dijumpai pada semua tipe habitat, baik hutan primer, sekunder, persawahan maupun pemukiman.

Memiliki mata bulat dengan pupil mata vetikal berwarna hitam kecokelatan. Bola mata cenderung besar, menonjol; iris hitam coklat. Bagian ventral tubuh berwarna hijau, sedangkan pada bagian bibir sampai ke dorsal berwarna putih kehijauan. *Litoria infrafernata* umumnya bersuara sangat gaduh (jantan), dan mengumpul pada lahan berhutan, pemukiman dan atau bantaran sungai dimana terdapat genangan air, kubangan, kolam-kolam di pinggir jalan pada pemukiman. Panjang tubuh rata-rata 31 cm.

Litoria dan *Nyctimystes* yang hidup disepanjang

sungai/perairan, ‘memanggil’ pasangan potensial untuk kawin dari bawah pohon atau semak-semak di atas air. Setelah melakukan perkawinan, betina akan bertelur dan akan meninggalkan telur di air hingga tahap berudu. *Litoria* berkembang biak di air yang tenang ataupun di air beriak kecil. Makanan utama Hylidae adalah serangga (Muller 2005).

2. Famili Ranidae

a. *Rana* sp.

Rana sp., memiliki warna tubuh pada bagian ventral hitam keabu-abuan serta mengkilap dan berlendir, memiliki kepala yang besar, moncong sempit, mata besar, pupil mata berbentuk horizontal dan berada lebih ke arah belakang kepala. Pada bagian tibia dan femur berwarna putih bercak-bercak hitam. Pada bagian dorsal hitam keabu-abuan serta mengkilap dan berlendir. Panjang tubuh total mencapai 37 cm.

Allison dalam Beehler dan Marshall (2007) menyebutkan bahwa katak New Guinea famili Ranidae saat ini diklasifikasi dalam tiga genus yang distribusinya luas di Indo-Pasifik (*Rana*, *Platymantis* dan *Limnonectes*). Di Papua tercatat terdapat sembilan jenis *Rana*, yang mana dua diantaranya merupakan endemik. Genus *Platymantis* memiliki 6 jenis terdapat di Papua, lima jenisnya adalah endemik. *Limnonectes* merupakan salah satu genus *Rana* yang diintroduksi dari luar (Pulau

Jawa dan Sumatera) oleh para transmigran.

b. *Platymantis papuensis*

Platymantis papuensis memiliki warna tubuh berwarna coklat dan terdapat sedikit bintik-bintik berwarna hitam. Bentuk mata besar, menonjol; iris hitam coklat, bola mata bulat, pupil mata vertikal berwarna hitam kecokelatan. Jenis ini pada saat dijumpai berada tepat di atas batu dan beberapa jenis yang sama juga ditemukan berada di atas lantai hutan pada serasah. Pada siang hari, jenis ini berlindung di dalam lubang-lubang batu, dan juga pada lubang pohon.

Di Pulau Mansinam jenis ini memiliki populasi yang sangat banyak, dan hampir ditemukan di setiap tempat, bahkan di areal pemukiman, jenis tersebut masih ditemukan. Secara umum panjang tubuh total mencapai 44 cm.

Muller (2005) menyatakan bahwa genus *Platymantis* adalah terestrial dan semua jenisnya tidak tergantung pada air. *Platymantis* juga mengalami tahapan sama dengan Microhylidae dalam reproduksi, perkembangan langsung dari embrio (tidak melewati tahap berudu). Sedangkan genus *Rana* memiliki habitat di daerah sepanjang aliran sungai pada daerah dataran rendah hingga pada ketinggian 1.000 mdpl.

Penduduk Pulau Mansinam memiliki sebutan untuk spesies reptil dan amfibi yang terdapat di pulau tersebut. pada kelas amfibi spesies *Litoria infrafrenata* dengan sebutan kodok hijau, *Rana*

sp. disebut kodok, *Platymantis papuensis* dengan sebutan kodok. Sedangkan untuk reptil, *laticauda colubrina* dengan sebutan ular moni-moni, *Candoia* sp. dengan sebutan ular malu-malu.

DAFTAR PUSTAKA

- Allison A. 2007. Herpetofauna of Papua dalam Beehler, B. M and Marshall, A. The Ecology of Papua, Part One. Periplus Editions. Hong Kong. (Hal. 564-605).
- Alonso JR, Arévalo R, Weruaga E, Porteros JG, Briñón JG, and Aijón J. 2000. Comparative and developmental neuroanatomical aspects of the NO system, in Functional Neuroanatomy of the Nitric Oxide System, eds H. W. M. Stein busch, J. Deventé, and S. R. Vincent (Amsterdam: Elsevier), 51–109.
- BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). 1993. Biodiversity action plan for Indonesia. Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency: Jakarta.
- Conservation International. 2000. Teknik survei lapangan program penilaian cepat (*Rapid Assessment Program*).
- Dumutu J. 2010. Keanekaragaman herpetofauna di Kampung Mandekman dan Rawahayu Distrik Ulilin Kabupaten Merauke. Skripsi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Universitas Negeri Papua. (Tidak di terbitkan).
- Gibbons JW, Scott DE, Ryan TJ, Buhlmann KA, Tuberville TD, Metts BS, Greene JL, Mills T, Leiden Y, Poppy S and Winne CT. The global decline of reptiles, Déjà vu amphibians. Bioscience, 50 (8): 653-666. [https://doi.org/10.1641/0006-3568\(2000\)050\[0653:TGDORD\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1641/0006-3568(2000)050[0653:TGDORD]2.0.CO;2)
- Iskandar DT and Erdelen WR. 2006. Conservation of amphibians and reptiles Indonesia: issues and problems. Amphibian and Reptile Conservation, 4: 60-87.
- Iskandar DT. 1998. Amfibi Jawa Bali – Seri Panduan Lapang. Buku. Puslitbang Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia. Bogor. 109 p.
- Muller K. 2005. Keanekaragaman hayati papua. Wanggai. F, A. Sumule (editor); Penerjemah Ismoyo F, Kilmaskossu, A, Lumatauw, S, Nainggolan, N, Kilmaskossu M.St.E, Prawardani, S. Universitas Negeri Papua. Manokwari.
- Obst FJ, K. Ritcher and U Jacob. 1988. Atlas of reptiles and amphibians for the Terrarium. T.F.H. Publications.inc. United State of America.
- O'Shea M. 1996. A guide to the snake of Papua New Guinea. Independent Publishing. Port Moresby.
- Stebbins RC and Cohen NW. 1997. A natural history of amphibians. New Jersey: Princeton Univ. Pr.
- Yusuf LR. 2008. Studi keanekaragaman jenis reptil pada beberapa tipe habitat Di Eks-HPH PT. RKI Kabupaten Bungo Propinsi Jambi. Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan Dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor.